

การประเมินความหลากหลายของมันพื้นเมือง สกุล *Dioscorea* spp. ในจังหวัดน่านโดยใช้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการ

Evaluating diversity of local yams (*Dioscorea* spp.) in Nan province using yields and nutritional value

บรรจง อูปแก้ว^{1*} และ อนุชา จันทราบูน¹

Bunjong Oupkaew^{1*} and Anucha Chantaraboon¹

Received: 13 July 2023; Revised: 24 August 2023; Accepted: 11 September 2023

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายของมันพื้นเมือง สกุล *Dioscorea* spp. โดยใช้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการในจังหวัดน่าน ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่ารวมถึงการเป็นแหล่งอาหารทางเลือกสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นไป โดยทำการศึกษามันพื้นเมือง จำนวน 30 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยศึกษาพันธุ์มันพื้นเมืองที่เหมาะสมในการผลิตมันพื้นเมืองที่หายากในเชิงปริมาณและคุณภาพ สำหรับเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทนสำหรับปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นมันพื้นเมืองที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากการสำรวจมันพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดน่าน แล้วนำมาตรวจสอบระบุชนิดมันพื้นเมืองและชื่อวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจพบ ด้วยการอ้างอิงงานวิจัยและตรวจสอบจากเอกสารทางอนุกรมวิธาน โดยการทดลองปลูกในแปลงทดสอบผลผลิตใช้แผนทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ 3 ซ้ำ 30 พันธุ์ ประกอบด้วย มันเจ้า มันข้าว มันเลือด มันชา มันเหือก มันหมี มันเหน็บ มันแขง มันจาวพร้าว มันอ่อน มันกล้า มันเลือดนก มันอ้อ มันปลา มันหวาย มันกลบ มันหูช้าง มันพร้าวยาว มันมือเสือ มันเหลี่ยม มันอ่อน มันกุ๋ มันเสา มันแปลง มันกองข้าว มันเห็บ มันกองขี้ มันหัวช้าง มันเหลือง และมันพร้าวญี่ปุ่น ผลการทดลองพบว่าพันธุ์มันพื้นเมืองทั้ง 30 พันธุ์ ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P < 0.01$) โดยมันกล้าและมันเลือดเป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงที่สุดและผลผลิตมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยให้ผลผลิต 6,638 และ 6,517 กิโลกรัมต่อไร่ และมีสหสัมพันธ์ทางบวกระหว่างผลผลิตกับน้ำหนักหัวสดและน้ำหนักหัวแห้ง มีค่า 0.99 และ 0.97 ตามลำดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและเป็นข้อมูลหนุนเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของมันพื้นเมืองเพื่อเป็นพืชอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพต่อไป

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, มันพื้นเมือง, จังหวัดน่าน

Abstract

This research aimed to Evaluating Diversity of Local Yams (*Dioscorea* spp.) in Nan Province using yields and nutritional value. To Enhance and develop the potential to add value to commercial production (e.g for use as an alternative food source), we studied local yams of 30 local yam varieties in Nan Province. The objective was to find the suitable local and rare varieties for use as substitute food sources and for planting in Nan Province. Local yams obtained were obtained by collection of samples from a survey of local yams in Nan province and all were identified to species and scientific names were applied. They were examined by using research and taxonomic documents as references and planted in test plots. A randomized experimental plan within three blocks was used with 30 replications

¹ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

¹ Department of Plant Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Nan, Thailand

* Corresponding author: landscape@rmutl.ac.th

in each. The local yam varieties were. - Jao, Khao, Luead, Sa, Yueak, Mee, Neb, Sang, Jaoprao, Aon, Klam, Luead nok, Ao, Pla, Wai, Klab, Hoo chang, Praoyao, Mue suae, Liam, On, Koo, Sao, Plang, Kong kao, Heb, Kong kee, Hau chang, Lueang and Prao poo. The results showed that all 30 local yams varieties had a statistically highly significant difference in yield ($P < 0.01$). Klam and Luead were the ones that had highest yields with good quality and suitable to be planting in Nan Province. Yields were 6,638 and 6,517 kg. per rai and there were positive correlations between yield and fresh weight of tuber and dried weight of tuber is 0.99 and 0.97, respectively. The results of this study can be applied to enhance production efficiency and serve as supporting data for utilizing the diversity of local yam as an alternative healthy food source.

Keywords: Growth performances, local yams, Nan province.

บทนำ

มันป่าหรือมันพื้นเมือง (yam) เป็นพืชตระกูลหัวที่มีความสำคัญและมีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก มีหลายชนิดและหลายวงศ์ แต่ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Dioscoreaceae สกุล Dioscorea spp. (Santisuk & Larsen, 2009) โดยมีชื่อสามัญเรียกแตกต่างกันไปจำเพาะตามท้องถิ่น เช่น มันนก มันพร้าว มันจาวมะพร้าว มันเสา มันขมิ้น มันเลือด มันมือเสือ เป็นต้น เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากการนำส่วนสะสมอาหารที่อยู่ใต้ดิน ทั้งที่เป็นราก หัว และไหล มาบริโภค หรือแปรรูปเพื่อเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ (โอรสรัชชาติ, 2548) ซึ่งหัวมันพื้นเมืองส่วนใหญ่จะมีคาร์โบไฮเดรตหรือพวกโพลีแซคคาไรด์เป็นองค์ประกอบหลัก (Anjali & Kathi, 1999) ปัจจุบันมันพื้นเมืองได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพมากขึ้น เพราะมีสารสำคัญหลายชนิดในมันพื้นเมืองที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยมีสรรพคุณในการรักษาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของสตรีวัยหมดประจำเดือน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม แอนโทไซยานิน และแคโรทีนอยด์ (รงรอง หอมหวาน และคณะ, 2560) จึงนำมันพื้นเมืองมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ ใช้ในเวชภัณฑ์คุมกำเนิด และเป็นแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ (Anjali & Kathi, 1999) เช่น ในเนื้อมันเลือดสีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานินสูงซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีและมีเส้นใยสูง เหมาะที่จะนำมาทำอาหารให้กับผู้ป่วยเบาหวาน (Lazze *et al.*, 2004) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมันพื้นเมืองเริ่มหายาก เนื่องจากนิยมนาและขาดมาจากป่าตามธรรมชาติแต่ขาดการปลูกทดแทน ทำให้มันพื้นเมืองบางชนิดแทบจะสูญหายและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (สิทธิโชค ศรีโซ, 2022) อีกทั้งอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม การปรับตัวทางนิเวศน์ ระยะเวลาในการปลูก จะส่งผลให้การเจริญ

เติบโตและการให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน (Tamiru *et al.*, 2008) และด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์และแหล่งที่สำรวจพบตามธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นในการศึกษาการเจริญเติบโต ลักษณะจำเพาะของแต่ละสายพันธุ์ หรือการศึกษาทางเภสัชเวท และวินิจฉัยชนิดพืช เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Wu *et al.*, 2005) ซึ่งการศึกษานุกรมวิชาการที่ซับซ้อนและภัยคุกคามจากการปฏิบัติทางการเกษตรทำให้พืชสกุลนี้มีความสำคัญต่อการจัดการกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของมันพื้นเมืองอย่างเหมาะสมและจัดการเชื้อพันธุกรรม (Ngo ngwe *et al.*, 2015) ดังนั้นการประเมินความหลากหลายของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea spp. โดยใช้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการในจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์มันพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์มันพื้นเมืองและนำมาศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการเกี่ยวกับปริมาณแป้ง โปรตีน และเส้นใย ของพันธุ์มันพื้นเมืองเพื่อหาพันธุ์ที่มีศักยภาพการผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของอาหารในช่วงเวลาวิกฤตอาหาร และเพื่อเป็นพืชอาหารทางเลือกต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดำเนินการวิจัย

1. สถานที่ทดลองและการวางแผนการทดลอง

การทดลองครั้งนี้ดำเนินการทดลอง ณ สถานที่ปฏิบัติการพืชสวน สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design) ทำ 3 ซ้ำ ประกอบด้วยพันธุ์มันพื้นเมืองจำนวน 30 พันธุ์ (Table 1) โดยมีมันอ่อนซึ่งเป็นมันพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (พันธุ์ควบคุม) ทำการทดลองในฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2565 มีขนาดแปลง 1x30 เมตร จำนวน 15 แปลง

ทดลอง แปลงยาว 30 เมตร โดยใช้ระยะปลูกแปลงย่อยขนาด 1x5 เมตร

Table 1 Local yam in *Dioscorea* spp. in Nan Province

No.	Common name	Scientific name
1	Jao	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.
2	Khao	<i>Dioscorea birmanica</i> Prain & Burkill
3	Luead	<i>Dioscorea alata</i> L.
4	Sa	<i>Dioscorea filiformis</i> Blume
5	Yueak	<i>Dioscorea depauperata</i> Prain & Burkill
6	Mee	<i>Dioscorea tamarisciflora</i> Prain & Burkill
7	Neb	<i>Dioscorea stemonoides</i> Prain & Burkill
8	Sang	<i>Dioscorea pseudotomentosa</i> Prain & Burkill
9	Jaoprao	<i>Dioscorea</i> spp.
10	Aon	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill
11	Klam	<i>Dioscorea oryzetorum</i> Prain & Burkill
12	Luead nok	<i>Dioscorea inopinata</i> Prain & Burkill
13	Ao	<i>Dioscorea paradoxa</i> Prain & Burkill
14	Pla	<i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour.
15	Wai	<i>Dioscorea decipiens</i> Hook.f.
16	Klab	<i>Dioscorea inopinata</i> Prain & Burkill
17	Hoo chang	<i>Dioscorea nitens</i> Prain & Burkill
18	Praoyao	<i>Dioscorea glabra</i> Roxb.
19	Mue suaee	<i>Dioscorea esculenta</i> L.
20	Liam	<i>Dioscorea velutipes</i> Prain & Burkill
21	On	<i>Dioscorea daunea</i> Prain & Burkill
22	Koo	<i>Dioscorea pentaphylla</i> L.
23	Sao	<i>Dioscorea filiformis</i> Blume
24	Plang	<i>Dioscorea hamiltonii</i> Hook.f
25	Kong kao	<i>Dioscorea petelotii</i> Prain & Burkill
26	Heb	<i>Dioscorea gracilipes</i> Prain & Burkill
27	Kong kee	<i>Dioscorea plectranthus rotundifolius</i> Prain & Burkill
28	Hau chang	<i>Dioscorea rockii</i> Prain & Burkill
29	Lueang	<i>Dioscorea wallichii</i> Hook.f.
30	Prao poo	<i>Dioscorea laurifolia</i> Wall.

(Wilkin & Thapayai, 2009)

2. การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกมันพื้นเมืองโดยใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นส่วนหัวพันธุ์ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างมันพื้นเมืองจากโครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นเมืองในเขตภาคเหนือเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ 1 (บรรจง อุปแก้ว และคณะ, 2564) โดยรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นเมืองในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ระหว่างเดือน เมษายน - ธันวาคม 2564 จาก 14 อำเภอของจังหวัดน่าน และนำส่วนขยายพันธุ์ของมันพื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ที่สำรวจพบไปเก็บรักษาไว้ที่ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และระบุชนิดมันพื้นเมืองจากตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจพบอ้างอิงงานวิจัยและตรวจสอบจากเอกสารทางอนุกรมวิธาน คือ (Wilkin & Thapayai, 2009) เมื่อมันพื้นเมืองอายุได้ 15 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อายุได้ 60 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และอายุได้ 120 วันหลังปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชนั้น มีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันหลุมก่อนปลูกในอัตรา 5 กรัมต่อหลุม สำหรับหนอนขนอนใบและหนอนเจาะเถา มันพื้นเมืองจะฉีดพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* อัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกสองสัปดาห์และช่วงที่มีแมลงระบาด สำหรับโรคใบจุดและโรคราแป้งฉีดพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* ไอโซเลท อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกสองสัปดาห์และเมื่อพบการระบาดของโรค

3. การเก็บข้อมูล

1) ลักษณะทางการเกษตรและการเจริญเติบโตของลำต้น ได้แก่

1.1) ความยาวเถา วัดความยาวเถาเฉพาะต้นหลักของมันพื้นเมืองจากโคนต้นจนถึงปลายยอดเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จจึ้นพันธุ์ละ 5 ต้น แล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

1.2) ดัชนีพื้นที่ใบ วัดใบทั้งหมดของมันพื้นเมืองพันธุ์ละ 5 ต้นต่อซ้ำโดยการตัดออกจากแปลงมาวัด จากนั้นใช้เครื่องสแกนภาพและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพและแอปพลิเคชันมือถือ (Leafscan, Petiole, Easy Leaf Area) จากนั้นพื้นที่ใบที่วัดสามารถแบ่งตามพื้นที่เพื่อให้ได้ LAI อีกทางหนึ่ง โดยใช้สูตร ดัชนีพื้นที่ใบ = พื้นที่ใบ / พื้นที่ปลูก แล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

1.3) จำนวนกิ่งแขนง นับจำนวนกิ่งแขนงที่มีจำนวนข้อไม่น้อยกว่า 3 ข้อที่เกิดขึ้นทั้งต้นพันธุ์ละ 5 ต้น

ต่อซ้ำ เมื่อมันพื้นเมืองอายุ 90 วัน หลังจากปลูกแล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2) ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่

2.1) น้ำหนักเถาสต นำส่วนเหนือดินพันธุ์ละ 5 ต้นต่อซ้ำ ตัดออกจากแปลงซึ่งน้ำหนักเถาสตแล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2.2) น้ำหนักเถาแห้ง นำส่วนเหนือดินพันธุ์ละ 5 ต้นต่อซ้ำ ตัดออกจากแปลงอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้วนำมาชั่งน้ำหนักเถาแห้งแล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2.3) น้ำหนักหัวสด ที่อายุเก็บเกี่ยวโดยนำส่วนใต้ดินพันธุ์ละ 5 ต้นต่อซ้ำ นำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด หัวที่สมบูรณ์ไม่ฝ่อหรือเน่าเสียและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตรขึ้นไป นำมาชั่งน้ำหนักหัวสดแล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2.4) น้ำหนักหัวแห้ง ที่อายุเก็บเกี่ยวโดยนำส่วนหัวใต้ดินจากข้อ 2.3 มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง นำมาชั่งน้ำหนักแห้งแล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2.5) จำนวนหัวต่อต้น นับหัวมันพื้นเมืองพันธุ์ละ 5 ต้นต่อซ้ำ นำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยโดยหัวมันพื้นเมืองที่สมบูรณ์ไม่ฝ่อหรือเน่าเสียและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป แล้วคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อต้น

2.6) ผลผลิตหัวมันสดต่อไร่ เก็บเกี่ยวหัวสดที่อายุ 210 วัน หลังปลูกซึ่งน้ำหนักรวมของผลผลิตสดแล้วคำนวณผลผลิตต่อไร่

3) คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่

3.1) ปริมาณแป้ง ตามวิธี มอก. 274-2521 วิเคราะห์ปริมาณแป้ง ได้จาก 100 ลบด้วยผลรวมระหว่างปริมาณความชื้น ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณเส้นใย และปริมาณเถ้า

3.2) ปริมาณโปรตีน วิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl Method (AOAC, 2000) โดยชั่งเนื้อมันแห้ง 5 กรัม ใส่ลงใน Kjeldahl flask เติม Mixed catalyst: CuSO_4 0.1 กรัม, NaSO_4 2 กรัม และ $\text{conc.H}_2\text{SO}_4$ 25 กรัม ย่อยบน heating mantle โดยให้ความร้อนอ่อน ๆ จนกระทั่งหมดฟอง แล้วค่อยเพิ่มความร้อนอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส การคำนวณและการวิเคราะห์โปรตีน

$$\text{ปริมาณโปรตีน (ร้อยละ)} = \frac{(A-B) \times N \times 1.4 \times F}{W_1}$$

A คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตกับตัวอย่างมันพื้นเมือง (มิลลิลิตร)

B คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตกับ blank (มิลลิลิตร)

W_1 คือ น้ำหนักของตัวอย่างมันพื้นเมือง

N คือ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก (N)

F คือ ค่าแฟคเตอร์

3.3) ปริมาณเส้นใย วิเคราะห์โดยวิธี AOAC (2000) การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยโดยวิธีการย่อยตัวอย่างมันพื้นเมืองด้วยสารละลายกรดและด่างภายใต้สภาวะที่กำหนด จากนั้นนำส่วนที่เหลือจากการย่อยไปอบและเผา เพื่อหาส่วนที่หายไปหลังจากการเผา ซึ่งก็คือ ปริมาณเส้นใย

$$\text{ปริมาณเส้นใย} = \frac{(W_4 - W_3 - W_2) - (W_5 - W_3)}{W_1} \times 100$$

เมื่อ W_1 คือ น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)

W_2 คือ น้ำหนักกระดาษกรอง (กรัม)

W_3 คือ น้ำหนักถ้วยกระเบื้อง (กรัม)

W_4 คือ น้ำหนักถ้วยกระเบื้อง กระดาษกรองและภากล้างการอบแห้ง (กรัม)

W_5 คือ น้ำหนักถ้วยกระเบื้อง และภากล้างการเผา (กรัม)

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

นำข้อมูลการเจริญเติบโตของมันพื้นเมืองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's New Multiple Range Test และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ตามวิธีของ Gomez and Gomez (1984) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ STAR 2.0.1 และกำหนดความเชื่อมั่นทางสถิติที่ $P < 0.01$

ผลการทดลองและอภิปรายผล

1. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต

มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีน้ำหนักหัวสดอยู่ระหว่าง 3,813–8,297 กรัมต่อต้น (Table 2) และโดยเฉลี่ยมีน้ำหนักหัวสด 5,690 กรัมต่อต้น โดยมีมันกล้า มันเลือด และมันจาวพร้าว เป็นพันธุ์ที่ให้น้ำหนักหัวสดสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยให้น้ำหนักหัวสด 8,297, 8,146 และ 7,765 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ในขณะที่มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีน้ำหนักหัวสด 4,783 กรัมต่อต้น น้ำหนักหัวแห้ง พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีน้ำหนักหัวแห้งอยู่ระหว่าง 545–1,185 กรัมต่อต้น (Table 2) และโดยเฉลี่ยมีน้ำหนักหัวแห้ง 799 กรัมต่อต้น โดย

มันกล่ำ มันเลือด และมันจาวพร้าว เป็นพันธุ์ที่ให้น้ำหนักหัวแห้งสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยให้น้ำหนักหัวแห้ง 1,185, 1,143 และ 1,109 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ในขณะที่มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีน้ำหนักหัวแห้ง 683 กรัมต่อต้น จำนวนหัวต่อต้นพันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีจำนวนหัวต่อต้นอยู่ระหว่าง 2.0–9.0 หัวต่อต้น (Table 2) และโดยเฉลี่ยมีจำนวนหัวต่อต้น 3.6 หัวต่อต้น โดยพันธุ์มันอ่อนและมันอ้อ เป็นพันธุ์ที่มีจำนวนหัวต่อต้นสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์

อื่น ๆ โดยมีจำนวนหัวต่อต้น 9.0 และ 8.7 หัวต่อต้น ตามลำดับ ผลผลิตหัวต่อไร่ พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 3,051–6,638 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) และโดยเฉลี่ยให้ผลผลิต 4,598 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมันกล่ำและมันเลือด เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวต่อไร่สูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยให้ผลผลิตหัวต่อไร่ 6,638 และ 6,517 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ในขณะที่มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) ให้ผลผลิต 3,827 กิโลกรัมต่อไร่

Table 2 Yield characteristics and yield components content of 30 Local yam varieties grown in Nan province.

Local yam varieties	Fresh weight of tuber (g/plant)	Dried weight of tuber (g/plant)	heads/plant	Yield (kg/rai)
1. Jao	5,783 ^f	826 ^f	3.0 ^{de}	4,627 ^{fg}
2. Khao	7,428 ^b	929 ^{bcd}	3.0 ^{de}	5,977 ^{cd}
3. Luead	8,146 ^a	1,143 ^a	2.0 ^g	6,517 ^{ab}
4. Sa	5,526 ^{fg}	737 ^{gh}	4.0 ^c	4,421 ^{fgh}
5. Yueak	7,467 ^b	933 ^{bc}	3.0 ^{de}	6,020 ^{cd}
6. Mee	6,833 ^c	933 ^{bc}	3.0 ^{de}	5,787 ^d
7. Neb	5,193 ^{gh}	692 ^{hi}	4.0 ^c	4,154 ^{hi}
8. Sang	5,975 ^{def}	854 ^{cdef}	3.0 ^{de}	4,780 ^{ef}
9. Jaoprao	7,765 ^{ab}	1,109 ^a	2.0 ^g	6,212 ^{bc}
10. Aon	4,783 ^{hi}	683 ^{hi}	9.0 ^a	3,827 ^{ij}
11. Klam	8,297 ^a	1,185 ^a	2.3 ^g	6,638 ^a
12. Luead nok	4,087 ^{kl}	584 ^{kl}	3.3 ^d	3,269 ^{lm}
13. Ao	4,113 ^{kl}	588 ^{kl}	8.7 ^a	3,290 ^{lm}
14. Pla	5,910 ^{ef}	844 ^{ef}	4.0 ^c	4,728 ^{fg}
15. Wai	4,336 ^{ijkl}	619 ^{ijkl}	4.0 ^c	3,469 ^{kl}
16. Klab	6,733 ^c	962 ^b	3.0 ^{de}	5,815 ^{cd}
17. Hoo chang	5,730 ^{fg}	819 ^g	3.0 ^{de}	4,599 ^{fg}
18. Praoyao	6,500 ^{cd}	929 ^{bcd}	2.0 ^g	5,835 ^{cd}
19. Mue suae	5,932 ^{def}	847 ^{def}	2.0 ^g	4,650 ^{fg}
20. Liam	5,449 ^{fg}	778 ^g	3.0 ^{de}	4,359 ^{gh}
21. On	6,430 ^{cde}	918 ^{bcd}	8.0 ^b	5,144 ^e
22. Koo	3,813 ^l	545 ^l	4.0 ^c	3,051 ^m
23. Sao	5,467 ^{fg}	781 ^g	2.0 ^g	4,373 ^{fgh}
24. Plang	4,702 ^{hij}	672 ^{hij}	3.0 ^{de}	3,761 ^{ijk}
25. Kong kao	5,433 ^{fg}	776 ^g	3.0 ^{de}	4,347 ^{gh}
26. Heb	4,363 ^{ijkl}	623 ^{ijkl}	4.0 ^c	3,490 ^{kl}
27. Kong kee	4,330 ^{ijkl}	619 ^{ijkl}	3.0 ^{de}	3,464 ^{klm}
28. Hau chang	4,193 ^{kl}	599 ^{kl}	2.3 ^g	3,354 ^{klm}

Table 2 Yield characteristics and yield components content of 30 Local yam varieties grown in Nan province. (Cont.)

Local yam varieties	Fresh weight of tuber (g/plant)	Dried weight of tuber (g/plant)	heads/plant	Yield (kg/rai)
29. Lueang	5,594 ^g	799 ^g	4.0 ^c	4,475 ^{gh}
30. Prao poo	4,396 ^{jk}	628 ^{jk}	2.7 ^{ef}	3,517 ^{kl}
Mean	5,690	799	3.6	4,598
F-test	**	**	**	**
CV (%)	4.7	4.8	6.6	4.1

** = statistically significant difference ($P < 0.01$); Different letters labeled in the same column showed statistically significant differences ($P < 0.01$) using Duncan's New Multiple Range Test.

จากผลการทดลอง (Table 2-3) เมื่อพิจารณาผลผลิตของพันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ พบว่า ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) โดยมันกล้าและมันเลือดเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ และเมื่อพิจารณาลักษณะผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตของผลผลิตมันพื้นเมือง คือ น้ำหนักหัวสดและน้ำหนักหัวแห้งตลอดจนลักษณะทางเกษตรอื่น ๆ พบว่า พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีลักษณะผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและลักษณะทางเกษตรอื่น ๆ ที่ต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีความสามารถในการปรับตัวและให้ผลผลิตต่างกันเมื่อปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน และจากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตของพันธุ์มันพื้นเมืองจากการทดสอบ 30 พันธุ์ (Table 5) พบว่า ผลผลิตหัวมันสดต่อไร่มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับจำนวนกิ่งแขนง ความยาวเถา น้ำหนักหัวสด และน้ำหนักหัวแห้งโดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.39, 0.35, 0.99 และ 0.97 ตามลำดับ ($P < 0.01$) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามันกล้าและมันเลือดให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ก็เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีสหสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงระหว่างผลผลิตกับน้ำหนักหัวสดต่อต้นและน้ำหนักหัวแห้งต่อต้นที่สูงและมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ เนื่องด้วยเป็นพันธุ์ที่มีขนาดของหัวมันสดที่ใหญ่ เนื้อแน่นละเอียด ไม่ฉ่ำน้ำ และเมื่อนำไปอบแห้งมีระเหยของน้ำในเนื้อที่น้อยกว่าพันธุ์อื่น ๆ และมีสหสัมพันธ์ของลักษณะองค์ประกอบผลผลิตที่สูงกว่าลักษณะจำนวนกิ่งแขนง และความยาวเถา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีระดับความสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิตระดับปานกลาง (ละอองศรี ศิริเกสร และคณะ 2561; รัชชัย คุรุบรรเจดจิต, 2558; รัชชัย คุรุบรรเจดจิต และคณะ, 2558; อำนวย อรรถรังรอง และคณะ, 2558; Darkwa *et al.*, 2019) และน้ำหนักหัวสดมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ ดัชนีพื้นที่ใบ ความยาวเถา น้ำหนักเถาสด และน้ำหนักเถาแห้ง และจำนวนกิ่งแขนงต่อต้น โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.52, 0.36, 0.19, 0.23 และ 0.38 ตามลำดับ ($P < 0.01$) แสดงให้เห็นว่าพันธุ์มันพื้นเมืองที่ให้ผลผลิตสูงจะเป็นพันธุ์ที่มีองค์

ประกอบของผลผลิตที่ดี คือ มีน้ำหนักหัวสดและน้ำหนักหัวแห้งสูง ดังนั้นการที่มันกล้าและมันเลือดให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ก็เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีองค์ประกอบของผลผลิตในเกณฑ์ที่ดีกว่านั่นเอง (Table 5-6) โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันกล้าและมันเลือดมีน้ำหนักหัวสด และน้ำหนักหัวแห้งสูง คือ เป็นพันธุ์ที่มีดัชนีพื้นที่ใบ ความยาวเถา น้ำหนักเถาสด น้ำหนักเถาแห้งและจำนวนกิ่งแขนงต่อต้นมากนั่นเอง ซึ่งมันกล้าและมันเลือดมีน้ำหนักหัวสด 8,297 และ 8,146 กรัมต่อต้น มีน้ำหนักหัวแห้ง 1,185 และ 1,143 กรัมต่อต้น มีดัชนีพื้นที่ใบ 2.2 และ 2.2 ตารางเซนติเมตร มีความยาวเถา 432 และ 456 เซนติเมตร มีน้ำหนักเถาสด 3,557 และ 3,437 กรัมต่อต้น มีน้ำหนักเถาแห้ง 762 และ 726 กรัมต่อต้น และมีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้น 2 และ 4 กิ่ง ต่อต้น ตามลำดับ (Table 2-3) ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tamiru *et al.* (2008) ที่พบว่าความหลากหลายของสายพันธุ์มันพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการปรับตัวของสายพันธุ์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมลักษณะทนแล้ง ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเร็ว องค์ประกอบของผลผลิต คุณภาพผลผลิตที่ดี คุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ เป็นเกณฑ์การคัดเลือกสายพันธุ์มันพื้นเมืองที่สำคัญที่สุด และมันพื้นเมืองสายพันธุ์ *Dioscorea alata* L. มีลักษณะดีหลายประการ รวมถึงการต้านทานโรคแอนแทรกคโนส ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์อาจมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มความต้านทานต่อโรค และความทนทานต่อความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในมันพื้นเมือง จากการศึกษาแบบการเจริญเติบโต แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมของมันพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมพันธุ์แบบธรรมดาใน *Dioscorea alata* L. สามารถนำไปใช้ในมันพื้นเมืองสกุล *Dioscorea* spp. ในการพัฒนาสายพันธุ์สู่เกษตรกร (Darkwa *et al.*, 2019) ดังนั้นผลจากการทดลองจึงชี้ให้เห็นว่า พันธุ์มันพื้นเมืองที่ให้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพดี คือ มันกล้าและมันเลือด

2. ลักษณะทางการเกษตรและการเจริญเติบโตของลำต้น

มันพื้นเมือง 30 พันธุ์มีน้ำหนักเกาสตอยู่ระหว่าง 422-3,561 กรัมต่อต้น (Table 3) และโดยเฉลี่ยมีน้ำหนักเกาสต 2,345 กรัมต่อต้น โดยมันเหน็บ มันกล้า และมันเลือด เป็นพันธุ์ที่มีน้ำหนักเกาสตสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีน้ำหนักเกาสต 3,561, 3,557 และ 3,437 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ มีน้ำหนักเกาสตแตกต่างจากพันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีน้ำหนักเกาสต 525 กรัมต่อต้น น้ำหนักเกาสตแห้ง พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีน้ำหนักเกาสตแห้งอยู่ระหว่าง 133-762 กรัมต่อต้น (Table 3) และโดยเฉลี่ยมีน้ำหนักเกาสตแห้ง 492 กรัมต่อต้น โดยมันกล้าและมันเลือด เป็นพันธุ์ที่มีน้ำหนักเกาสตแห้งสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีน้ำหนักเกาสตแห้ง 762 และ 726 กรัมต่อต้น ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ มีน้ำหนักเกาสตแห้งแตกต่างจากพันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีน้ำหนักเกาสตแห้ง 357 กรัมต่อต้น ดัชนีพื้นที่ใบ พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีดัชนีพื้นที่ใบอยู่ระหว่าง 1.1-2.3 ตารางเซนติเมตร (Table 3) โดยเฉลี่ยมีดัชนีพื้นที่ใบ 1.6 ตารางเซนติเมตร โดยมันมือเสือ มันกล้า มันเลือด และมันข้าว เป็นพันธุ์ที่มีดัชนีพื้นที่ใบมากและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีดัชนีพื้นที่ใบ 2.3, 2.2, 2.2 และ 2.2 ตารางเซนติเมตรตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ มีดัชนีพื้นที่ใบแตกต่างจากพันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีดัชนีพื้นที่ใบ 1.3 ตารางเซนติเมตร ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Darkwa

et al., (2019) ที่พบว่าศักยภาพของผลผลิตและลักษณะพืชอื่น ๆ จะมีสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลผลิตหัวที่สูงกับการเจริญเติบโตของลำต้น เช่น ปริมาณคลอโรฟิลล์ รูปร่างใบ ความหนาแน่นของปากใบ ความกว้างของพืช ความยาวเถาที่มีระดับความสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิต และการชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ข้ามปีสำหรับสายพันธุ์ *Dioscorea alata* L. จะทำให้ได้ผลผลิตหัวมันสดที่มากขึ้นกว่าการเก็บเกี่ยวในฤดูเดียว (Tamiru *et al.*, 2008) ความยาวเถา พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีความยาวเถาอยู่ระหว่าง 120-480 เซนติเมตรต่อต้น (Table 3) และโดยเฉลี่ยมีความยาวเถา 344 เซนติเมตรต่อต้น โดยมันเลือดนก มันเลือด มันมือเสือ มันเจ้า มันข้าว มันชา มันแขง มันพร้าวยาว และมันพร้าวญี่ปุ่น เป็นพันธุ์ที่มีความยาวเถามากและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีความยาวเถา 480, 459, 456, 447, 445, 445, 435, 433 และ 431 เซนติเมตรต่อต้น ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ มีความยาวเถาแตกต่างจากพันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีความยาวเถา 239 เซนติเมตร จำนวนกิ่งแขนงต่อต้น พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้นอยู่ระหว่าง 1-4 กิ่งต่อต้น (Table 3) และโดยเฉลี่ยมีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้น 3 กิ่งต่อต้น โดยมันเลือด มันเหยือก มันหมี มันจาวพร้าว และมันเลือดนก เป็นพันธุ์ที่มีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้นสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้น 4 กิ่งต่อต้น ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ มีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้นแตกต่างจากพันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีจำนวนกิ่งแขนงต่อต้น 2 กิ่งต่อต้น

Table 3 Agricultural characteristics of the 30 Local yam varieties grown in Nan province.

Local yam varieties	vine fresh weight (g/plant)	vine dry weight (g/plant)	leaf area index (sq.cm.)	Vine length (cm/plant)	number of branching/plant (branches)
1. Jao	1,930 ^k	391 ^{mn}	1.2 ^{jk}	44 ^{5a} b	2 ^c
2. Khao	2,982 ^e	441 ^{kl}	2.2 ^a	44 ^{7a} b	3 ^b
3. Luead	3,437 ^a	726 ^{ab}	2.2 ^a	456 ^{ab}	4 ^a
4. Sa	2,763 ^{gh}	551 ^{gh}	2.0 ^c	44 ^{5a} b	3 ^b
5. Yueak	3,193 ^d	657 ^c	2.1 ^b	415 ^b	4 ^a
6. Mee	2,962 ^{ef}	578 ^{ef}	1.7 ^{de}	350 ^c	4 ^a
7. Neb	3,561 ^a	716 ^b	1.1 ^l	419 ^b	3 ^b
8. Sang	422 ^p	268 ^p	1.8 ^d	43 ^{5a} b	2 ^c
9. Jaoproao	3,383 ^{bc}	660 ^c	1.2 ^{jk}	416 ^b	4 ^a
10. Aon	525 ^{op}	357 ^{no}	1.3 ^{ghij}	23 ^{9d}	2 ^c
11. Klam	3,557 ^a	762 ^a	2.2 ^a	43 ^{2a} b	2 ^c
12. Luead nok	1,072 ⁿ	188 ^q	1.2 ^{jk}	480 ^a	4 ^a
13. Ao	1,628 ^l	387 ^{mn}	1.2 ^{jk}	154 ^e	2 ^c

Table 3 Agricultural characteristics of the 30 Local yam varieties grown in Nan province. (Cont.)

Local yam varieties	vine fresh weight (g/plant)	vine dry weight (g/plant)	leaf area index (sq.cm.)	Vine length (cm/plant)	number of branching/plant (branches)
14. Pla	676 ^o	146 ^r	1.3 ^{ghi}	156 ^e	2 ^c
15. Wai	2,637 ^{hi}	482 ^{ij}	1.2 ^{kl}	360 ^c	2 ^c
16. Klab	1,349 ^m	376 ^{mn}	1.2 ^c	239 ^d	2 ^c
17. Hoo chang	1,682 ^l	467 ^{jk}	1.4 ^f	269 ^d	2 ^c
18. Praoyao	2,479 ^{ij}	519 ^{hi}	1.3 ^{ghij}	43 ^{3ab}	3 ^b
19. Mue suaee	1,100 ⁿ	133 ^r	2.3 ^a	45 ^{9ab}	3 ^b
20. Liam	2,466 ^j	414 ^{lm}	1.8 ^d	347 ^c	1 ^d
21. On	2,945 ^{ef}	517 ^{hi}	1.6 ^e	254 ^d	2 ^c
22. Koo	2,683 ^h	571 ^{fg}	1.3 ^{fg}	12 ^{0e}	2 ^c
23. Sao	2,669 ^h	538 ^{gh}	1.3 ^{ghi}	275 ^d	3 ^b
24. Plang	3,222 ^{cd}	672 ^c	1.3 ^{gh}	270 ^d	3 ^b
25. Kong kao	1,870 ^k	374 ⁿ	1.4 ^f	277 ^d	3 ^b
26. Heb	3,387 ^{bc}	719 ^b	1.2 ^{kl}	355 ^c	2 ^c
27. Kong kee	2,804 ^{gh}	572 ^{fg}	2.0 ^c	337 ^c	2 ^c
28. Hau chang	2,862 ^{efg}	617 ^{de}	2.0 ^c	356 ^c	2 ^c
29. Lueang	1,233 ^{mn}	328 ^o	1.2 ^{hijk}	238 ^d	1 ^d
30. Prao poo	2,863 ^{efg}	640 ^{cd}	1.1 ^{kl}	43 ^{1ab}	2 ^c
Mean	2,345	492	1.6	344	3
F-test	**	**	**	**	**
CV (%)	3.3	3.6	3.2	7.1	4.2

** = statistically significant difference ($P < 0.01$); Different letters labeled in the same column showed statistically significant differences ($P < 0.01$) using Duncan's New Multiple Range Test

ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละอองศรี ศิริเกษร และคณะ (2561); อำนวย อรรถรังรอง และคณะ (2558); Darkwa *et al.* (2019) ที่พบว่าน้ำหนักผลผลิต หัวต่อไร่ที่สูงสหมสัมพันธ์ทางบวกกับน้ำหนักเถาสด น้ำหนักเถาแห้ง และความยาวเถา ดังนั้นมันกล้าและมันเลือดที่มีลักษณะทางการเกษตรและการเจริญเติบโตของลำต้นที่ดีจึงเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงนั่นเอง

3. ลักษณะคุณภาพของหัวมันพื้นเมือง

ลักษณะคุณภาพภายในของหัวมันพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ พบว่ามันพื้นเมือง 30 พันธุ์มีปริมาณแป้ง ปริมาณโปรตีน และปริมาณเส้นใย ที่แตกต่างกันซึ่งพันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีปริมาณแป้งอยู่ระหว่าง 47.0-69.4 กรัมต่อ 100 กรัม (Table 4) และโดยเฉลี่ยมีปริมาณแป้ง 60.5 กรัมต่อ 100 กรัม โดยมันหวาย มันมือเสือ และมันกองขี้ เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีปริมาณแป้ง

69.4, 69.0 และ 68.9 กรัมต่อ 100 กรัม ในขณะที่พันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควม) มีปริมาณแป้ง 60.5 กรัมต่อ 100 กรัม ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tamiru *et al.* (2008) ที่ศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และการจัดการพันธุ์มันพื้นเมืองสกุล *Dioscorea* spp. จากเอธิโอเปียตอนใต้ พบว่าปริมาณแป้งอยู่ระหว่าง 65.2-76.6 กรัมต่อ 100 กรัม และสอดคล้องกับ Wu *et al.* (2016) ที่พบว่าปริมาณแป้งในพันธุ์มันพื้นเมืองสกุล *Dioscorea* spp. จำนวน 25 ชนิด โดยมีปริมาณแป้งอยู่ระหว่าง 60.7 - 80.6 กรัมต่อ 100 กรัม และมีค่าเฉลี่ย 69.5 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งปริมาณแป้งที่พบในสายพันธุ์ *Dioscorea opposita*., *Dioscorea fordii* Prain & Burkill., *Dioscorea alata* L. และ *Dioscorea persimilis* Prain & Burkill. จะมีปริมาณแป้งที่สูงขึ้น ปริมาณโปรตีน พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 3.4-11.9 กรัม ต่อ 100 กรัม (Table 4) และโดยเฉลี่ยมีปริมาณโปรตีน 9.6 กรัม

ต่อ 100 กรัม โดยมันแกบ มันหมี มันเลือด มันจาวพร้าว มันเหน็บ มันอ่อน มันแปลง มันหัวช้าง มันชา และมันข้าว เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีปริมาณโปรตีน 11.9, 11.8, 11.7, 11.6, 11.6, 11.6, 11.4, 11.4 และ 11.3 กรัม ต่อ 100 กรัม ตามลำดับ ในขณะที่มันพื้นเมืองพันธุ์อื่น ๆ นั้นมีปริมาณโปรตีนต่ำกว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tamiru *et al.* (2008) ที่พบว่ามันพื้นเมืองสกุล *Dioscorea* spp. มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 6.4 -13.4 กรัม ต่อ 100 กรัม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu *et al.* (2016) ที่รายงานเช่นเดียวกันว่าปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 6.3-12.2 กรัม ต่อ 100 กรัม ในสายพันธุ์ *Dioscorea alata* L. ในการศึกษาลักษณะความหลากหลายทางโภชนาการ และองค์ประกอบทางชีวภาพของเชื้อพันธุ์มันพื้นเมือง *Dioscorea* spp. ปลูกในประเทศจีน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รงรอง หอมหวาน (2560); สมนึก พรหมแดง และคณะ (2561) ที่พบว่า เมื่อนำมันเลือดมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ในตัวอย่างมันเลือด 3 ชนิด ที่ความเข้มข้นของสาร

สีม่วงภายในหัวต่างกัน พบปริมาณโปรตีนระหว่าง 8.1 -11.4 กรัม ต่อ 100 กรัม ซึ่งมันเลือดถือเป็นตัวแทนของมันพื้นเมืองที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง ปริมาณเส้นใย พันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ มีปริมาณเส้นใยอยู่ระหว่าง 1.3-4.6 กรัม ต่อ 100 กรัม (Table 4) และโดยเฉลี่ยมีปริมาณเส้นใย 3.5 กรัม ต่อ 100 กรัม โดยมันพร้าวยาว, มันอ่อน, มันจาวพร้าว, มันอ่อน, มันเลือด และมันกล้า เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณเส้นใยสูงและแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีปริมาณเส้นใย 4.6, 4.6, 4.5, 4.5 และ 4.4 กรัม ต่อ 100 กรัม ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์มันอ่อน (พันธุ์ควบคุม) มีปริมาณเส้นใย 3.8 กรัม ต่อ 100 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในหัวมันพื้นเมืองจะแตกต่างกันไปตามลักษณะพันธุ์ดังปรากฏในผลการทดลองนี้และได้มีรายงานอิทธิพลของพันธุ์ที่มีผลต่อปริมาณแป้ง โปรตีน และเส้นใย ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละอองศรี ศิริเกสร และคณะ (2561); รัชชัย คุรุบรรเจตจิต (2558); รัชชัย คุรุบรรเจตจิต และคณะ (2558); Tamiru *et al.* (2008), Wu *et al.* (2005)

Table 4 Nutritive value starch, protein and fiber content of 30 local yam varieties grown in Nan province.

Local yam varieties	starch content (%)	protein content (%)	fiber content (%)
1. Jao	67.2 ^b	9.6 ^g	3.1 ^g
2. Khao	51.6 ^o	11.3 ^{bc}	2.2 ^k
3. Luead	58.4 ⁱ	11.7 ^{ab}	4.5 ^a
4. Sa	66.4 ^c	11.3 ^{bc}	2.2 ^k
5. Yueak	52.3 ⁿ	8.29 ^k	2.1 ^k
6. Mee	47.0 ^q	11.6 ^{ab}	3.8 ^d
7. Neb	63.1 ^f	11.6 ^{ab}	3.5 ^f
8. Sang	57.1 ^{kl}	6.8 ^l	2.8 ^h
9. Jaoprao	57.0 ^{kl}	11.6 ^{ab}	4.5 ^a
10. Aon	60.5 ^h	11.6 ^{ab}	3.8 ^d
11. Klam	59.8 ⁱ	7.7 ^l	4.4 ^{ab}
12. Luead nok	66.4 ^c	9.2 ^h	2.7 ^{hi}
13. Ao	64.4 ^e	8.5 ^k	4.6 ^a
14. Pla	60.5 ^h	8. 8 ^{ij}	3.9 ^d
15. Wai	69.4 ^a	10.3 ^e	1.3 ^k
16. Klab	59.5 ⁱ	11.9 ^a	3.8 ^d
17. Hoo chang	64.2 ^e	8.9 ^{hi}	2.5 ^{ij}
18. Praoyao	65.4 ^d	8.8 ^{ij}	4.6 ^a
19. Mue suae	69.0 ^a	7.9 ^l	2.8 ^h
20. Liam	66.6 ^c	10.8 ^c	2.7 ^{hi}
21. On	57.5 ^k	7.9 ^l	4.5 ^a

Local yam varieties	starch content (%)	protein content (%)	fiber content (%)
22. Koo	48.3 ^p	10.1 ^{ef}	3.6 ^{de}
23. Sao	64.5 ^e	7.9 ^l	4.2 ^{bc}
24. Plang	56.7 ^l	11.4 ^{abc}	4.2 ^c
25. Kong kao	51.9 ^{no}	9.7 ^g	4.1 ^c
26. Heb	55.8 ^m	9.9 ^g	4.1 ^{bc}
27. Kong kee	68.9 ^a	3.4 ^o	2.7 ^l
28. Hau chang	62.8 ^g	11.4 ^{abc}	2.7 ^{hi}
29. Lueang	62.5 ^g	10.4 ^d	4.2 ^c
30. Prao poo	60.4 ^h	6.3 ⁿ	4.2 ^{bc}
Mean	60.5	9.6	3.5
F-test	**	**	**
CV (%)	3.4	4.8	2.7

** = statistically significant difference ($P < 0.01$); Different letters labeled in the same column showed statistically significant differences ($P < 0.01$) using Duncan's New Multiple Range Test.

ที่พบว่า อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม และความแตกต่างของสายพันธุ์ จะมีผลกระทบต่อการผลิตและปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะในสายพันธุ์ *Dioscorea opposita*. และ *Dioscorea alata* L. (Wu, *et al.*, 2016) นอกจากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จากลักษณะปริมาณคุณค่าทางโภชนาการภายในหัวมันพื้นเมืองแล้ว ยังขึ้นกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก และปฏิกริยาร่วมระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมด้วย (พิชัย สุรพรไพบูลย์, 2544)

Table 5 Correlation between yield and composition of yield of homegrown casava varieties from 30 cultivars tested.

character-istics	number of branching /plant	vine length	fresh head weight	dried head weight
yield	0.39 ^{**}	0.34 ^{**}	0.99 ^{**}	0.97 ^{**}

Remark ** = There was a statistically significant correlation ($P < 0.01$)

Table 6 Correlation between leaf area index, vine length, vine fresh weight, vine dry weight, number of branches per plant of local yam varieties from the cultivar test in Nan province.

characteristics	fresh head weight
leaf area index	0.52 ^{**}
vine length	0.36 ^{**}
vine fresh weight	0.19 ^{**}
vine dry weight	0.23 ^{**}
number of branches per plant	0.38 ^{**}

Remark ** = There was a statistically significant correlation ($P < 0.01$)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความหลากหลายของมันพื้นเมืองสกุล *Dioscorea* spp. โดยใช้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการในจังหวัดน่าน พบว่าพันธุ์มันพื้นเมือง 30 พันธุ์ ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P < 0.01$) โดยพันธุ์มันพื้นเมืองมีความแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ในทุกลักษณะที่ได้ศึกษา โดยมันกล้าและมันเลื้อยเป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด และมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีปริมาณโปรตีนและปริมาณเส้นใยสูงที่สุด แสดงถึงความเหมาะสมเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของแหล่งโปรตีนจากพืช และจากการวิเคราะห์ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต น้ำหนักหัวสดและน้ำหนักหัวแห้งสูงที่สุด

โดยมีสหสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับผลผลิตต่อไร่ โดยลักษณะทางการเกษตรและการเจริญเติบโตของลำต้นมันกล้าและมันเลื้อยมีความยาวเถา น้ำหนักเถาสด และน้ำหนักเถาแห้งมาก อีกทั้งเป็นพันธุ์ที่มีจำนวนกิ่งแขนงและดัชนีพื้นที่ใบที่สูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงปฏิกริยาร่วมระหว่างพันธุ์กับสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงส่งผลต่อผลผลิตที่สูง มันกล้าและมันเลื้อยจึงเป็นพันธุ์ที่มีความสามารถในการปรับกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้ดี มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง การต่อยอดการวิจัยสามารถนำลักษณะน้ำหนักหัวสดและน้ำหนักหัวแห้ง เป็นลักษณะใช้ในการเลือกพันธุ์มันพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิต เนื่องจากลักษณะทั้งสองมีค่าสหสัมพันธ์กับผลผลิตสูง และการวิจัยพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างการจัดลำดับจีโนมและตรวจสอบสารสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ได้พันธุ์กรรมที่เหมาะสมและพันธุ์กรรมประชากรที่แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันพื้นเมืองเป็นอาหารทางเลือก ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากปัญหาการขาดแคลนน้ำมีมากขึ้น พืชสกุล *Dioscorea* spp. เป็นแหล่งอาหารที่ใช้หน้ น้อยกว่าการปลูกข้าวมาก ดังนั้นจึงควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แก่เกษตรกร เพื่อเป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งสำหรับเป็นทางเลือกกรณีพืชอาหารต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้ทุนวิจัย และขอขอบคุณ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สาขาพืชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

บรรจง อุปแก้ว, พิกุล สุพรไพบูลย์, อภิรยา เทพสุคนธ์, สุชาทิพย์ ไชยวงศ์, นลัทพร คูหา และสุภัควดี พิมพ์มาศ. (2564). *สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมมันพื้นเมืองในเขตภาคเหนือเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ปีที่ 1*. รายงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

พิชัย สุพรไพบูลย์. (2544). *เอกสารประกอบการสอนวิชาหลัก การปรับปรุงพันธุ์พืช*. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน.

รัชชัย คุรุบรรเจตจิต. (2558). *การทดสอบพันธุ์มันเทศประกอบ การรับรองพันธุ์*. รายงานโครงการวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558.

รัชชัย คุรุบรรเจตจิต, ณรงค์ แดงเปี่ยม, กำพล เมืองโคมพัล, เพ็ญจันทร์ สุชานุกูล, ทศนัย เพิ่มสัจย์ และ พรรณผกา รัตนโกศล. (2558). *การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อ การบริโภคสด*. กรมวิชาการเกษตร.

รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สมนึก พรหมแดง, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ประเทือง ดอนสมไพโร, รัตนา เอกรัมย์ และสนธิชัย จันทร์เปรม. (2560). *การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านสกุล Dioscorea เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทน*. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6(1), 127-137.

รงรอง หอมหวล. (2560). *มันเลื้อย มันพื้นบ้าน มากประโยชน์*. เกษตรอภิรมย์, 3(18), 36-38.

ละอองศรี ศิริเกสร, สุชาดา บุญเลิศนรินทร์ และวชิรญา เหลียวตระกูล. (2561). *การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศ 6 พันธุ์*. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏศรีวิชัย, 10(3), 411-423.

สิทธิโชค ศรีโซ. (2022). *Local yam*. <https://www.greenery.org/g101-thai-dioscorea/>.

สมนึก พรหมแดง, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รัตนา เอกรัมย์ และสุลักษณ์ แจ่มจำรัส. (2561). *สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลื้อย*. วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์, 1(1), 19-27.

ไอรส รักษาติ. (2548). *สมบัติเคมีฟิสิกส์ของสตาร์ชจากพืชหัวในสกุล Dioscorea*. บางชนิดที่พบในประเทศไทย [ปริญาวิทยาสตรดุษฎีบัณฑิต, เทคโนโลยีชีวภาพ]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อำนาจ อรรถรังรอง, สุภาวดี สมภาค, ดรุณี สมณะ และ ทิพย์ ดรุณี สิทธินาม. (2558). *การเปรียบเทียบพันธุ์ มันเทศ ลูกผสมเนื้อสีส้ม (ชุดที่ 2)*. รายงานโครงการวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558.

Anjali, K & Kathi, J. (1999). Wild Yam (*Dioscoreaceae*). *Journal of Herbal Pharmacotherapy*, 3(4), 77-91

AOAC. (2000). *Official method of analysis*. The Association of Official Analytical Chemists Inc.

Darkwa, K., Olanmi, B., Asiedu, R. & Asfaw, A. (2019). Review of empirical and emerging breeding methods and tools for yam (*Dioscorea* spp.) improvement: Status and prospects. *Journal Plant Breeding*, 139 (2), 474-497.

- Gomez, K.A. & A.A. Gomez. (1984). *Statistical procedures for agricultural research*. John Wiley and Sons.
- Lazze, M.C., Savio, M., Pizzala, R., Cazzalini, O., Perucca, P., Scovassi, A.I., Stivala, L.A. & Bianchi, L. (2004). Anthocyanins induce cell cycle perturbations and apoptosis in different human celllines. *Journal Carcinogenesis*, 25 (8), 1427-1433.
- Ngo ngwe, M. F. S., Omokolo, N. D. & Joly, S. (2015). *Evolution and phylogenetic diversity of yam species (Dioscorea spp.): implication for conservation and agricultural practices*. PLoS ONE, 10(12), e0145364.
- Tamiru, M., Becker, C. H. & Maass, L. B. (2008). Diversity, distribution and management of yam landraces (*Dioscorea* spp.) in Southern Ethiopia. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 88(10), 1675-1685.
- Santisuk, T. & K. Larsen. (2009). *Flora of Thailand*. The Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department.
- Wilkin, P. & Thapyai, C. (2009). *Dioscoreaceae*. In Santisuk T. & Larsen K., eds. *Flora of Thailand*. Prachachon.
- Wu, W. H., Chung, C. J., Liu, L. Y., Jou, H. J. & Wang, T. A. (2005). Estrogenic effect of yam ingestion in healthy postmenopausal women. *Journal of the American College of Nutrition*, 24(4), 235-243.
- Wu, G. Z., Chung, W, Nitin, M., Bao, Q. Z., Chen, L. S., & Tao, M. Z. (2016). Characterizing diversity based on nutritional and bioactive compositions of yam germplasm (*Dioscorea* spp.) commonly cultivated in China. *Journal of Food and Drug Analysis*, 24 (2), 367-375.